

ต่อมน้ำลายพาโรติดบวม :

ผลข้างเคียงจากการบ้วนปากด้วยยาบ้วนปากคลอเฮกซิดีน

The Parotid Gland Swelling : Side effect of chlorhexidine mouth wash

มัลลิกา ศิริรัตน์

Mulika Sirirat. D.D.S., Grad. Dip. in Clin. Sc.

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Department of Oral Medicine, Faculty of Dentistry,
Mahidol University, Bangkok 10400, Thailand.

บทคัดย่อ

ยาบ้วนปากคลอเฮกซิดีนเป็นสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์และควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์เหนือเหงือก ผลข้างเคียงทั่วไปของยาบ้วนปากนี้คือมีรสขม ฟันติดคราบสีน้ำตาลและเยื่อผิวของเยื่อเมือกลอกหลุดไป แต่ยังมีผลข้างเคียงอีกประการหนึ่งซึ่งพบได้น้อยมาก คือการบวมของต่อมน้ำลายพาโรติด บทรายงานผู้ป่วยนี้ได้รายงานผู้ป่วยที่มีต่อมน้ำลายพาโรติดบวมหลังจากทำ ศัลยกรรมตัดแต่งปุ่มกระดูกงอกและให้ผู้ป่วยบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากคลอเฮกซิดีน วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น เมื่อให้ผู้ป่วยหยุดบ้วนน้ำยา และเปลี่ยนเป็นบ้วนน้ำเกลือ เมื่อวันมาตัดไหมอาการบวมของต่อมน้ำลายพาโรติดหายไป ใบหน้ากลับสู่สภาวะปกติ

Abstract

Chlorhexidine mouth wash is a chemical agent which has antibacterial properties. It is very efficient in supragingival plaque control. The general side effects are bitter taste, brown staining of the teeth and desquamation of oral mucosa. However, there is a swelling of parotid gland which is a very rare side effect of chlorhexidine. This case report shows the patient with bilateral parotid swelling following osteoectomy and osteoplasty and rinsing with chlorhexidine mouth wash. When the therapist asked the patient for stopping rinsing and changing to normal saline, the swelling of the glands disappeared and the patient's face turned to normal figure on the day he came for removing the stitches.