

สภาวะทันตสุขภาพของผู้ป่วยในรายที่สงสัยมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นเอดส์ : รายงานผู้ป่วย 1 ราย

สุขุมล ลิขิตวงศ์ขจร **

พัชรี ธงศิลา *

พินยา แก้วหมื่นไวย *

พิลพันธุ์ ขำตันวงศ์ *

ไพพรรณ กองพิมพ์ *

ภานุวัฒน์ คำภาเกะ *

บทคัดย่อ

โรคเอดส์ (AIDS) ย่อมาจากคำว่า Acquired immunodeficiency syndrome ซึ่งแปลว่ากลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากเชื้อไวรัส HIV (Human immunodeficiency Virus) เชื้อ HIV จะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาวทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเสื่อม หรือบกพร่องลงเป็นผลทำให้การติดเชื้อและป่วยเป็นโรคต่างๆได้ง่ายโดยเมื่อได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วประมาณ 1-2 สัปดาห์ผู้นั้นอาจมีอาการอ่อนเพลีย คล้ายเป็นไข้หวัดแล้วอาจจะหายไปเอาแต่สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้หลังจากนั้นประมาณ 2-3 เดือนหากตรวจเลือดสำหรับ HIV จะพบปฏิกิริยาเป็นบวกผู้ได้รับเชื้อจะเป็นปกติได้หลายปีโดยไม่ต่างจากคนทั่วไปจนกว่าเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 จะลดต่ำลงมากจนไม่สามารถต้านทานจุลชีพต่างๆได้ผู้นั้นจะเริ่มป่วยด้วยโรคต่างๆเป็นๆหายๆหรือเป็นเรื้อรังผู้ป่วยจะทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆและมักตายด้วยโรคติดเชื้อ เชื้อ HIV จะมีสูงมากในเลือดน้ำอสุจิและมูกในช่องคลอดการหลีกเลี่ยงการสัมผัสปัจจัยดังกล่าวจะเป็นวิธีป้องกันการติดเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกายอีกทั้งการให้มารดาที่ติดเชื้อ HIV รับประทานยาต้านไวรัสเอดส์จะทำให้โอกาสที่เด็กในครรภ์จะติดเชื้อลดน้อยลงด้วย

คำไชรหัส : เชื้อไวรัส HIV โรคติดเชื้อ ยาด้านไวรัสเอดส์

** อาจารย์ภาควิชาทันตสาธารณสุข ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น

* นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 25 วสส ขก.