



มหาวิทยาลัย

Original Article

อุบัติการณ์การเกิดถุงน้ำเดนต์เจอร์สร่วมกับ ฟันคุดของฟันกรามซี่ที่สามล่าง

สุรินทร์ ตั้งสุภูมิ วท.บ., ท.บ., ส.ม. ป.ชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ ศึกษาอุบัติการณ์การเกิดถุงน้ำเดนต์เจอร์สร่วมกับฟันคุดของฟันกรามซี่ที่สามล่าง ในกรณีที่ผ่าตัดเอาออกเพื่อป้องกันโรค

วัสดุและวิธีการ ศึกษาจากพยาธิสภาพของเนื้อเยื่ออ่อนที่ยึดติดบริเวณคอฟันของฟันคุดของฟันกรามซี่ที่สามล่าง ซึ่งได้รับการผ่าตัดออกจากผู้ป่วยจำนวน 90 ราย

ผลการศึกษา อุบัติการณ์การเกิดถุงน้ำเดนต์เจอร์สร่วมกับฟันคุดของฟันกรามซี่ที่สามล่าง คิดเป็นร้อยละ 52.2 และถุงน้ำที่มีสภาพเทียบเคียงกับถุงน้ำเดนต์เจอร์ส คิดเป็นร้อยละ 18.9

สรุป ฟันคุดของฟันกรามซี่ที่สามล่างควรได้รับการผ่าตัดออกเพื่อป้องกันมิให้เนื้อเยื่อรอบ ๆ คอฟันของฟันคุดมีพยาธิสภาพเกิดขึ้น

(ว ทนต จุฬาฯ 2548;28:109-16)

คำสำคัญ: ถุงน้ำเดนต์เจอร์ส; ฟันกรามซี่ที่สามล่าง; ฟันคุด

บทนำ

ฟันกรามซี่ที่สามล่างเป็นฟันที่มีโอกาสเป็นฟันคุดได้มากที่สุด และก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้มาก การผ่าตัดฟันคุดของฟันกรามซี่ที่สามล่างเป็นหัตถการที่ต้องทำบ่อยในแผนกศัลยกรรมช่องปากของโรงพยาบาลเกือบทุกแห่ง เมื่อผ่าตัดฟันคุดของฟันกรามซี่ที่สามออกแล้ว เนื้อเยื่อที่ยึดติด

รอบๆคอฟันคุดมักจะเป็นส่วนของถุงหุ้มหน่อฟัน (dental follicle)¹ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาในอดีตพบว่า ควรจะผ่าตัดเอาฟันคุดของฟันกรามซี่ที่สามออกเพื่อมิให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อรอบๆ ฟันไปเป็นถุงน้ำเนื้องอก การละลายของรากของฟันกรามซี่ที่สอง และปัญหาทางเนื้อเยื่อปริทันต์อื่นๆ² และพบว่าร้อยละ 67 ของผู้ป่วยที่

Incidence of dentigerous cysts associated with impacted mandibular third molars

Surin Tangsuphoom B.Sc., D.D.S., M.P.H., Cert. in Oral Surgery

Dental department, Charoenkrung Pracharak Hospital, Bangkok Metropolitan Administration

Abstract

Objective The purpose of this study was to investigate the incidence of dentigerous cysts associated with impacted mandibular third molars for routine prophylactic removal.

Materials and methods Pathological conditions of cystic like soft tissue attached to the cervical surface of impacted mandibular third molars which were removed from 90 patients were studied.

Results The incidence of dentigerous cyst arising from impacted mandibular third molars was 52.2% and of compatible with dentigerous cyst was 18.9%.

Conclusion Impacted mandibular third molars should be removed for preventing pathological changes of pericoronal tissues.

(CU Dent J. 2005;28:109-16)

Key words: *dentigerous cyst; impacted tooth; mandibular third molars*
